

برنامج التغذية الورقية والتحفيز الحيوي

الزيتون




ملاحظة : يجب الحفاظ على النسبة ما بين الكمية المستخدمة للعلاج مع نسبة التركيز ، لأن أي زيادة أو نقصان يحدث خلل

جدول الرش الورقي													الحد الأقصى تركيز المواد سم3 / أوقرام / لتر
أسماء المنتجات المستخدمة	عدد مرات الاستخدام في الزرعة الواحدة	كمية استخدام العلاج لتولم تدار مع 60-40 لتر ماء	نرش الورقي	الأوراق المتفصلة دون الوصول للحجم النهائي	الأوراق تصل إلى الشتل والحجم النهائي	النتية تصل إلى 30% من الحجم النهائي	النتية تصل إلى 70% من الحجم النهائي	ظهور وتطور عناقيد الأزهار	أولى الأزهار متفتح	50% من الأزهار متفتحة	نهاية الإزهار وتشكل الثمرة والأزهار تصل إلى 60% من حجم الثمرة إلى الشتل النهائي، تصبح الثمرة صلبة وغير قابلة للطعم أو البيع		
مراحل النمو	BBCH		سم3/غم	16-13	19-17	33-31	37-34	53-51	60	65-61	69-67	75-71	
Stimulants & Activators	AMINOPRIM												4
	GROWN												8
	TYTANIT	3	20-40			◆		◆		◆			1
	OPTYSIL	4-3	50			◆		◆			◇	◆	1
	OPTYCAL	4-2	150			◇	◇	◆		◆		◇	3
	FOSFYN												4
	CUPRAN												5
ALKALIN	K+Si	3-1	600-300		◇	◇	◇						5
	KB+Si	4-2	300-100		◇	◇					◆		5
	PK10 : 20												5
MIKROCHELAT	Fe-13 (PH 1-7)	4-2	100-50		◆	◆	◆	◆					1.5
	Cu - 15 (PH 2-10)	3-2	100-50		◇	◆	◆	◆					1
	Mn-13 (PH 3-10)	3-2	100-25	◆	◆	◆	◆					◇	1.5
	Zn-15 (PH 2-11)	4-2	100-50		◇	◆	◆	◆				◇	1.5
	Fe-6-0-0 (PH 2-11)												
MIKRO	KOMPLEX	3	500-300		◆	◆	◆					◇	15
	PLUS ULTRA												1
MIKROVIT	BORON-T	2	80						◆		◆		2
	MOLIBDEN												1.5
PLONVIT LUQUID	CALCIUM-T	5-3	600-400								◇	◆	10
	FOSTAR	3	600-300					◆			◆	◆	10
	G20:20:20	3-2	500-200		◆	◆	◆					◇	5
PLONVIT DRY	OPTY	3-2	500-200		◆	◆	◆					◇	5
	NITRO	3-2	500-200			◆	◆	◆				◇	5
	PHOSPHO	3	500-200					◆			◆	◆	5
	KALI	3-1	500-200		◇	◇	◇					◆	5

الحد الأقصى لاستخدام المنتجات لكل لتر ماء رش في حالة استخدام 60 لتر ماء أو أقل لكل دونم (في حالة استخدام كمية أكبر من الماء يتم توزيع متطلبات الأسمدة على كمية الماء)

التسميد بالري			
الكمية (متر ³ /غم)	الحد الأقصى للجرعة كغم	الحد الأقصى للموسم	التسميد 1000 لتر
5-3	40-20		
5-3	270-50		
4-2	200	0.8 - 0.4	
3-1	50	0.15 - 0.05	
6-4	100	0.6 - 0.4	
3-1	100	0.3 - 0.1	
20-5	200	4 - 1	
5-2	100-1000		
10-5	40 - 10	40 - 10	
3-1	100	0.3 - 0.1	
		0.3 - 0.2	
		0.3 - 0.2	
		0.3 - 0.2	
		0.3 - 0.2	

عند إعداد محلول الأسمدة مع الأسمدة الأخرى ، يجب أن لا يتجاوز المجموع 0.2% من المحلول الكلي 2 كغم من جميع الأسمدة مع 1000 لتر ماء



ادیتینز ماکس

مساعدة نظامي

بمضمون تغذية أفضل لسطح الرش
بالمحلول المغذي.

يزيد من كفاءة المنتجات الأخرى
للمستخدمة ويسرع
متصاص ونقل المكونات النشطة
الكيميائية الزراعية.

[illegible]

نتائج فحص خلط المنتجات ■ ممكن خلطها بأمان في التراكيز الموصى بها ■ لا يوصى خلطها ■ عملية الخلط صعبة بسبب الماء المتكلس أو درجة الـ pH العالية وفي هذه الحالة يوصى باستخدام **بروكولا** الذي يحسن من الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء.

الوقاية من الفطريات

الزراعة بالحقل


🇸🇩 يجب استخدام أمينوبريم 0.2-0.5 لتر / 100 لتر من الماء و لإنتاج الأشتال محلول 0.3 (محفر التجديد) بعد الظروف التي تسبب الإجهاد على النباتات وكذلك مع مبيدات الفطريات أو المبيدات الحشرية (بعد التحقق من إمكانية الخلط)

مرحلة تطور الورق




الأوراق الأولى منفصله تماما
تطور نمو الأوراق

مرحلة تطور فروع النبتة



وصول الفرع إلى 10 %
وصول الفرع من 40 % إلى 70 %
تطور فروع النبتة

مرحلة تطور الإزهار



ظهور الأزهار
55 عناقيد الازهار
تبلغ ذروتها الإزهار

مرحلة تفتح الإزهار وتساقط أوراق الزهر



تفتح الإزهار من 10% إلى 50%

مرحلة تطور الثمرة



حجم الثمرة يصل من 10% إلى 50% من حجم الثمرة النهائي

