

برنامج التغذية الورقية والتحميز الحيوي
مشمش ودراق وخوخ




جدول الرش الورقي																	
اسماء المنتجات المستخدمة	عدد مرات الاستخدام في الزرعة الواحدة	كمية استخدام العلاج لتولم تقار مع 60-40 لتر ماء لرش الورقي	برغم أخضر	برغم أبيض	بداية الإزهار	جفاف الأزهره	نهاية الأزهار	نمو المبيض	نمو الثمار	وصول النمرة 90% من الحجم النموذجي	بداية التضخم المعمر	تلون الثمار	القطف	معالجة بعد الحصاد نهاية تدفق النسجه	الأوراق لا تزال خضراء، تبدأ الأوراق في تغيير اللون سيم : الأحمر الأصفر، التعتير المراد	مرات الشو	
BBCH		سواء	00-00	55	59-57	64-60	69-67	72-71	73	78-75	79-76	78-77	81	85	92-91		
Stimulants & Activators	AMINOPRIM															4	
	GROWN															8	
	TYTANIT	4-3	40-20			◆	◆	◆					◆			1	
	OPTYSIL	5-4	50		◇	◆		◆		◆				◆		1	
	OPTYCAL	3-2	150				◆			◇						3	
	FOSFYN															4	
	CUPRAN	2	800-300	◆											◆	5	
ALKALIN	K+Si	7-6	600-300			◆			◇	◆	◆		◆	◆		5	
	KB+Si	7-5	300-100			◆	◆	◆		◆			◇			5	
	PK10 : 20	6-5	600-300			◆				◆	◇		◆	◆		5	
MIKROCHELAT	Fe-13 (Ph13)	2	100-50		◆			◆								1.5	
	Cu - 15 (Ph210)	2	100-50		◆	◆										1	
	Mn-13 (Ph341)	2	100-25		◇					◇						1.5	
	Zn-15 (Ph331)	5-3	100-50		◆	◆									◆	1.5	
	Fe-S-O-0 (Ph331)																
MIKRO	KOMPLEX	7-4	700-300		◆	◆		◇	◆	◆		◇				15	
	PLUS ULRA															1	
MIKROVIT	BORON-T	5-3	120-80		◆	◆	◆	◆								2	
	MOLIBDEN															1.5	
PLONVIT LIQUID	CALCIUM-T	7-3	600-400						◇		◇		◆	◆		10	
	FOSTAR	5-4	600-300			◇		◆	◆		◆					10	
	KALIPRIM	7-6	600-300			◆			◇	◆	◆		◆	◆		5	
	G20 20 20															5	
PLONVIT DRY	PTY	5-2	500-200			◇			◇		◆		◆			5	
	NITRO	5-3	500-200		◆	◆	◆	◆			◇				◇	5	
	PHOSPHO	5-4	500-200			◇		◆	◆							5	
	KALI	7-6	500-200			◆			◇	◆	◆		◆	◆			

ملاحظة : يجب الحفاظ على النسبة ما بين الكمية المستخدمة للعلاج مع نسبة التركيز ، لأن أي زيادة أو نقصان يحدث خلل

الحد الأقصى لاستخدام المنتجات لكل لتر ماء في حالة استخدام 60 لتر ماء أو أقل لكل دونم (في حالة استخدام كمية أكبر من الماء يتم توزيع متطلبات الأسمدة على كمية الماء)

التسميد بالري		التسميد 1000 لتر		عدد إعدامات الأسماك مع الأسمدة الأخرى ، يجب أن لا يتجاوز المجموع 0.2 % من المحلول الكلي 2 كغم من جميع الأسمدة مع 1000 لتر ماء	
الكمية سدس/كغم	الحد الأقصى لتيرة كغم	الحد الأقصى لتسموس			
5-3	40-20				
5-3	270-50				
4-2	200	0.3-0.4			
3-1	50	0.15-0.05			
6-4	100	0.6-0.4			
3-1	100	0.3-0.1			
20-5	200	4-1			
5-2	100-1000				
10-5	40-10	40-10 كغم			
3-1	100	0.3-0.1			
				0.3-0.2	
				0.3-0.2	
				0.3-0.2	
				0.3-0.2	

عند إعداد محلول الأسمدة مع الأسمدة الأخرى ، يجب أن لا يتجاوز المجموع 0.2% من المحلول الكلي 2 كغم من جميع الأسمدة مع 1000 لتر ماء

١ دونم
X 5 غم لتر
✓ 2.5 غم لتر
X 150 غم
✓ 75 غم

30 = لتر + 15 لتر


في حالة زيادة كمية المياه

1 دونم

120 لتر =

2.5 غم/لتر X

1.25 غم/لتر ✓

ادیتینز ماکس

مساعد نظامي
يضمن تغطية أفضل لسطح الرش
بالحلول المغذي.
ويزيد من كفاءة المنتجات الأخرى
المستخدمة ويسرع
امتصاص ونقل المكونات النشطة
الكيميائية الزراعية.

[illegible]

نتائج فحص خلط المنتجات ■ ممكن خلطها بأمان في التراكيز الموصى بها ■ لا يوصى خلطها ■ عملية الخلط صعبة بسبب الماء المتكلس أو درجة الـ pH العالية وفي هذه الحالة يوصى باستخدام **بروكوا** الذي يحسن من الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء.

