


للضلل - برنامج التغذية الورقية والتحفيز الحيوي للضلل – رسم توضيحي يأخذ البرنامج في الاعتبار المتطلبات الغذائية القياسية للبصل والحاجة إلى التحفيز الحيوي وزيادة المقاومة الطبيعية للنباتات لظروف النمو الضارة. يمكن للمزارع ضبط جرعة الاستعدادات وعدد العلاجات لظروف النمو الفردية.

انتاج الشتلات بالحقل

سماد ، محفز ، منشط

الجرعات الموصى بها في إنتاج الشتلات	
طريقة التحضير	تركيز المحلول
روتستار	الري/الرش : 0.05-0.1 %
بلونفيت نايترو او ابى بلونفيت اوبتي او اكشن اكتشن جرون ، بورمكس تيربو	ري/رش : 0.05-0.1 %
Fe-13 مايكروتنشيليت	رش 0.05 %
تيتاتيت	ري/رش : 0.02-0.03 %
امينويريم	رش : 0.3 %
اوبتسيل	رش/ري 0.05 %



كائنات دقيقة

سقي النبات بعد الزراعه باتلام

BACTIM VIGOR
0.3 %محلول
BACTIM FRETIMAX
1g / tray multiplat

تحضير الارض للبدن او الزراعه باتلام
BACTIM MIXER
10كغم/3م



قبل استطلاه الشتله اشتل دائمه
BACTIM VIGOR
100-200غم/دونم
BACTIM RECEPTOR
100-200غم/دونم

الزراعه بالحقل

يجب استخدام أمينويريم (0.2-0.5 لتر لكل 100 لتر ماء) و لإنتاج الاشتال محلول 0.3 (محفز التجديد) بعد الظروف التي تسبب الإجهاد على النباتات وكذلك مع مبيدات الفطريات أو المبيدات الحشرية (بعد التحقق من إمكانية الخلط) ، يعمل مكيف PROAQUA على تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه واستقرار المحلول.

العنصر الاستراتيجي لنظام التحكم في الإجهاد (SCS)

ترتيب تنفيذ الإجراءات
مواعيد التغذية الورقية
حسب مقياس BBCH



الظروف المثالية للرش الورقي هو 12 – 20 درجة مئوية , والرطوبة بين 60%-80% , ودرجة حرارة المحلول 15-20 درجة مئوية . **وقت الرش** هو في صباح الباكر او في المساء . الالتزام الكامل بعدم تجاوز الجرعة والتركيز المسموح به لكل مادة منفردة وحسب الظروف الجوية .

تاينيت

منشط الانتاج

يزيد من كمية الكلوروفيل في الأوراق. مما يزيد من التمثيل الضوئي ويؤثر إيجابيا على نمو الكتلة الحيوية والانتاج. يحسن بشكل كبير فعالية التلقيح وتطوير الأجزاء المنتجة للبذور والفاكهة. يحسن امتصاص المواد الغذائية من التربة ويقوي المقاومة الطبيعية للنباتات في ظروف الإجهاد

فروستكس

منشط مقاومة الصقيع

في الربيع يزيد من مقاومة النبات لانخفاض درجات الحرارة، يقلل بشكل كبير الاضرار التي تلحق بالأزهار وبراعمها بسبب الصقيع الخفيف في الربيع ويقلل من مخاطر فقدان جزء من او كل الانتاج.

كوبران

نحاس – منتج حماية للإجهاد الحيوي

يحد من عدد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض ويمنع نقص النحاس. (التوقف عن إعطاء هذه المادة حتى ظهور أول زهرتين)

الكالين

منتجات حماية عالية القلوية

تزود النباتات بالمواد الغذائية اللازمة وتدعم حماية النبات في وقت واحد وكذلك تحد من تطور الأمراض الفطرية.

فوسفين

برنامج حماية

يزيد الفوسفين بشكل مثالي من برامج الحماية ضد غن الفطريات في زراعة الخضراوات والتوت وأشجار الفاكهة وخاصة البياض الدقيقي والعفن الرمادي (يجب توقف إعطاء هذه المادة قبل اسبوعين من قطف الثمار)

اوبتكال

منشط الكالسيوم

يضمن التزويد الأمثل بالكالسيوم من خلال تحفيز امتصاص الكالسيوم من التربة ونقله إلى أصغر أجزاء النبات (تأثير مضخة أوكسين الكالسيوم). يوفر مباشرة الكالسيوم العضوي الذي يمكن امتصاصه بسهولة في العلاج الورقي . يحسن جودة الفواكه والخضراوات والتخزين في المحاصيل.

اوبتيسيل

محفز المناعة

يزيد من تحمل النبات لظروف النمو المعاكسة (مثل الجفاف والضغط الحيوية الأخرى) ويحد من تأثير الإجهاد الحيوي الناجم عن مسببات الأمراض و / أو هجوم الآفات. يحفز نمو جذور النباتات الصغيرة. يحسن المنتج ويحسن جودة ومقاييس تخزين المحاصيل.

امينوبريم

محفز الانتعاش

يحفز المقاومة والانتعاش السريع للنبات بعد الإجهاد. يزيد من فعالية وسلامة الكيماويات الزراعية العلاجية ويزيد من كمية وجودة المحصول. يحتوي على 50 %من الأحماض الأمينية. الجرعة للدونم ورقي (0.2 - 0.5 لتر)

جروأون

منشط الطاقة

يحفز نمو الأجزاء المنتجة للجذر والمحصول بشكل رئيسي في ظروف درجات الحرارة المنخفضة للتربة والهواء وفي التربة الحامضية. يزيد من تحمل النبات للطقس البارد ويحسن كمية وجودة المنتج. الجرعة للدونم ورقي (0.1 - 0.4 لتر)